



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA SALA DE IMUNIZAÇÕES

Data Emissão: 20/07/2019	Próxima Revisão: 30/06/2020	Páginas: 01 a 04	Versão: Nº 01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------

Atividade: Administração da Vacina Hepatite B (recombinante) - Intramuscular ou subcutânea.

Executante: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.

Apresentação:

A vacina da Hepatite B (recombinante) é apresentada sob a forma líquida em frasco unidose ou multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos.

Composição:

A vacina contém o antígeno recombinante de superfície (HBsAg), que é purificado por vários métodos físico-químicos e adsorvidos por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante. Deve ser conservada entre +2°C e +8°C, não podendo ser congelada.

Indicação:

A vacina previne a infecção pelo vírus da Hepatite B.

Contraindicação:

A vacina é contraindicada na ocorrência de reação anafilática após o recebimento de qualquer dose da vacina ou de seus componentes.

Via de administração:

Preferencialmente intramuscular, podendo ser subcutânea em pacientes portadores de discrasia sanguínea (por exemplo: hemofílicos).

Resultados esperados:

Possibilitar aos profissionais de saúde orientação e segurança na aplicação do produto e promoção do uso racional dos imunizantes, assim como, a diminuição dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV).

Procedimento para administração:**→ Para via intramuscular:**

- Higienize as mãos;
- Cheque o imunobiológico a ser administrado, assim como o usuário que irá recebê-lo;
- Aspire o conteúdo a ser administrado (conforme indicação do fabricante), verificando na graduação da seringa se a dosagem está correta;
- Prepare o usuário a ser vacinado;
- Introduza a agulha em ângulo de 90° na inserção inferior do músculo deltóide do braço direito;
- Aspire o local, observando se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se houver retorno venoso, despreze a dose (bem como a seringa e agulha utilizadas) e prepare uma nova dose;
- Injete a solução lentamente;
- Retire a seringa e agulha com movimento firme e único;
- Faça suave compressão do local da vacina com algodão seco;
- Higienize as mãos.

→ Para via subcutânea:

- Lavar as mãos;
- Cheque o imunobiológico a ser administrado, assim como o usuário que irá recebê-lo;
- Aspire o conteúdo a ser administrado (conforme indicação do fabricante), verificando na graduação da seringa se a dosagem está correta;
- Prepare o usuário a ser vacinado;
- Pince o tecido do local de administração usando o dedo indicador e o polegar;
- Mantenha a região firme e introduza a agulha com o bisel para cima, com rapidez e firmeza, formando um ângulo de 90°.
- Aspire e observe se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se houver retorno venoso, despreze a dose (bem como a seringa e agulha utilizadas) e prepare uma nova dose;

- Injete o líquido lentamente e retire a agulha com um movimento único e firme;
- Faça leve compressão no local com algodão seco;
- Higienize as mãos.

Observações:

- São consideradas reações adversas locais: dor, calor e rubor no local da aplicação e sistêmicas: febre, fadiga, tontura e cefaleia;
- Hepatite B é vacina não viva (recombinante) e pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra vacina independente do intervalo;
- Em recém-nascidos de mães portadoras de Hepatite B, administre a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B preferencialmente nas primeiras 12 horas, podendo a imunoglobulina ser administrada no máximo até 7 dias de vida;
- Antes de aspirar cada dose, faça movimentos rotatórios com o frasco da vacina em sentido único, para sua homogeneização, evitando, assim, eventos adversos locais mais intensos, principalmente em razão da presença do hidróxido de alumínio como adjuvante;
- O frasco multidose da hepatite b, uma vez aberto, poderá ser utilizado por prazo estabelecido pelo laboratório produtor constante da bula do produto ou normas do PNI;
- Esse prazo só deve ser respeitado se o imunobiológico for mantido sob temperatura adequada (+2°C a +8°C) e se forem adotados os cuidados que evitem a sua contaminação;
- A data e o horário da abertura do frasco devem ser anotados e fixados na ampola de maneira que não comprometam as informações do rótulo e a visualização do conteúdo interno;
- Vencido o prazo, despreze a vacina corretamente;
- O álcool comum não deverá ser utilizado pela sua baixa volatilidade e pelo baixo poder antisséptico;
- Em situações excepcionais, quando não houver água e sabão na zona rural, utilize álcool 70%;
- Quando usar o álcool 70% para a limpeza da pele, fricione o algodão

embebido por 30 segundas e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no procedimento.

- Adeque a agulha ao ângulo de administração (45° ou 90°) conforme a massa muscular do usuário a ser vacinado;
- Imediatamente após a administração da vacina de hepatite b em hemofílicos, faça uma compressão no local por 5 minutos com algodão seco;
- Comunique a enfermeira responsável pela sala de vacinas para notificação de reações adversas.

Preparado por:	Revisado por:	Aprovado:
Nair Olivia Dieckel e Núbia Tonazzo dos Santos.	Nair Olivia Dieckel e Núbia Tonazzo dos Santos.	Samantha Larissa Torres.