



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA SALA DE IMUNIZAÇÕES

Data Emissão:  
20/07/2019

Próxima Revisão:  
30/06/2020

Páginas:  
01 a 03

Versão:  
Nº 01

**Atividade:** Administração da meningocócica C (conjugada) (Meningo C).

Executante: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.

### **Apresentação:**

A vacina é apresentada em frasco-ampola de pó liofilizado injetável, além de um frasco-ampola de solução diluente ou em seringa unidose do imunobiológico.

### **Composição:**

É constituída por polissacarídeo capsulares purificados da Neisseria meningitidis do sorogrupo C. Tem como adjuvante o hidróxido de alumínio. Deve ser conservada entre +2°C C e +8°C, não podendo ser congelada.

### **Indicação:**

Está indicada para a prevenção da doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

### **Contraindicação:**

A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior historia de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico.

### **Via de administração:**

Exclusivamente por via intramuscular

### **Resultados esperados:**

Possibilitar aos profissionais de saúde orientação e segurança na aplicação do produto e promoção do uso racional dos imunizantes, assim como, a diminuição dos Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV).

**Principais atividades:**

- Higienize as mãos;
- Certifique-se do prazo de validade
- Prepare a vacina conforme orientação dada neste Manual;
- aspire o volume a ser administrado, verificando na graduação da seringa se a dosagem está correta;
- Prepare o usuário a ser vacinado;
- Faça a assepsia do local da administração, se necessário;
- Introduza a e aspire o local, observando se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Caso isso aconteça, retire a agulha e prepare outra dose da vacina;
- Injete a solução lentamente;
- Retire a seringa e a agulha com um movimento firme e único;
- Faça suave compressão no local da administração da vacina com algodão seco;
- Despreze a seringa e a agulha na caixa coletora de perfurocortante;
- Higienize as mãos.

**Observações:**

- Antes de aspirar cada dose, faça movimentos rotatórios com o frasco da vacina em sentido único, para sua homogeneização, evitando, assim, eventos adversos locais mais intensos, principalmente em razão da presença do hidróxido de alumínio como adjuvante;
- Utilize na administração da vacina a mesma agulha que foi usada na aspiração da dose;
- O álcool comum não deve ser utilizado pela sua baixa volatilidade (demora a secar) e pelo seu baixo poder antisséptico;
- Em situações excepcionais, quando não houver água e sabão na zona rural e em ambiente hospitalar, utilize o álcool a 70%;
- Quando usar o álcool a 70% para a limpeza da pele, friccione o algodão embebido por 30 segundos e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no procedimento;

- Comunique a enfermeira responsável pela sala de vacinas para notificação de reações adversas.

<b>Preparado por:</b> Nair Olivia Dieckel e Núbia Toniazzo dos Santos.	<b>Revisado por:</b> Nair Olivia Dieckel e Núbia Toniazzo dos Santos.	<b>Aprovado:</b> Samantha Larissa Torres.
--	---	---