

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA SALA DE IMUNIZAÇÕES		
Data Emissão: 30/07/2019	Próxima Revisão: 30/06/2020	Páginas: 01 a 03	Versão: Nº 01
Atividade: Administração da vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) (Tetra viral). Executante: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.			
Apresentação: A vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela é apresentada sob a forma liofilizada, em frasco unidose ou multidose, acompanhada do respectivo diluente.			
Composição: É composta por vírus vivos (atenuados) das cepas Schwarz do sarampo, RIT 4385 (derivada de Jeryl Lynn, da caxumba), RA 27/3 (do vírus da rubéola) e OKA (da varicela). Deve ser conservada entre +2°C e +8°C, não podendo ser congelada.			
Indicação: A vacina protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.			
Contraindicação: A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior historia de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico; anafilaxia após dose anterior; usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave.			
Via de administração: A vacina é administrada por via subcutânea.			
Resultados esperados: Possibilitar aos profissionais de saúde orientação e segurança na aplicação do produto e promoção do uso racional dos imunizantes, assim como, a diminuição dos Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV).			

Principais atividades:

- Higienize as mãos;
- Cheque o imunobiológico a ser administrado, assim como o usuário que irá recebê-lo;
- Reconstitua a vacina;
- Aspire o volume a ser administrado, verificando na graduação da seringa se a dosagem está correta;
- Prepare o usuário a ser vacinado;
- Faça a assepsia do local da administração, com água e sabão, se necessário;
- Introduza a agulha e injete a solução lentamente;
- Retire a seringa e a agulha com um movimento firme e único;
- Faça suave compressão no local de administração da vacina com algodão seco;
- Despreze a seringa e a agulha na caixa coletora de perfurocortante;
- Higienize as mãos.

Observações:

- Em situação de bloqueio vacinal em surto de sarampo ou rubéola para crianças menores de 12 meses, administre uma dose da vacina tríplice viral entre 6 meses e 11 meses de idade e mantenha o esquema vacinal, ou seja, uma dose de tríplice viral aos 12 meses de idade e uma dose de tetra viral aos 15 meses de idade;
- Em surto de varicela em ambiente hospitalar ou em área indígena, utilize a vacina varicela (atenuada) a partir dos 9 meses de idade;
- Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada) e estabeleça o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado;
- Quando utilizar o frasco multidose, ao aspirar cada dose, perfure a borracha em locais diferentes, evitando a parte central da tampa;
- Antes de aspirar cada dose, faça movimentos rotatórios em sentido único com o frasco da vacina para sua homogeneização, evitando, assim, reações locais mais intensas, principalmente em razão da presença do

hidróxido de alumínio como adjuvante;

- Os eventos adversos após a administração da vacina, quando ocorrem, são geralmente benignos;
- Os vacinados podem apresentar hipertermia entre o 4º e o 12º dia.

Preparado por:

Nair Olivia Dieckel e
Núbia Toniazzo dos Santos.

Revisado por:

Nair Olivia Dieckel e
Núbia Toniazzo dos Santos.

Aprovado:

Samantha Larissa
Torres.